

Impfkalender

Empfohlenes Impftermin:	Impfung für alle (schwarze Schrift) Impfung bei speziellem Anlass	spezieller Anlass
ab Beginn 3. Monat (ab Beginn 9. Lebenswoche)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV) Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis-B-Impfung (DTPa-IPV-Hib-HepB) 6-fach Kombinationsimpfung empfohlen 1. Pneumokokken-Konjugat-Impfung 	Jetzt generell für alle Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre empfohlen!
ab Beginn 4. Monat (ab Beginn 13. Lebenswoche)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV) Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis-B-Impfung (DTPa-IPV-Hib-HebB) 6-fach Kombinationsimpfung empfohlen 2. Pneumokokken-Konjugat-Impfung 	
ab Beginn 5. Monat (ab Beginn 17. Lebenswoche)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV) Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis-B-Impfung (DTPa-IPV-Hib-HebB) 6-fach Kombinationsimpfung empfohlen 3. Pneumokokken-Konjugat-Impfung 	
ab Beginn 12. - 14. Monat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV) Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis-B-Impfung (DTPa-IPV-Hib-HebB) 6-fach Kombinationsimpfung empfohlen 1. Masern-Mumps-Röteln (MMR) - Impfung Varizellen- (Windpocken-) Impfung 4. Pneumokokken-Konjugat-Impfung Meningokokken-C-Impfung 	Für alle Kinder im 2. Lebensjahr



Empfohlenes Impfalter:	Impfung für alle (schwarze Schrift) Impfung bei speziellem Anlass	spezieller Anlass
Ende 2. Lebensjahr bis 5. Lebensjahr	Pneumokokken-Konjugat-Impfung (wenn bisher nicht geimpft)	<p>Gefährdete Kleinkinder mit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angeborenem Immundefekt 2. Chronischer Krankheit von Atmungsorganen, Nieren, Herz- Kreislauforganen, bei Diabetes mellitus, Stoffwechselerkrankungen, Neurologischen Erkrankungen, vor Organtransplantation, vor immunsuppr. Therapie <p>Personen mit fortbestehender gesundheitl. Gefährdung können ab 2 J. ggf. zusätzlich Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff erhalten. Mindestabstand 2 Monate.</p>
ab 15. Monat bis spätestens zum Ende des 2. Lebensjahres	2. Masern-Mumps-Röteln (MMR) - Impfung	
ab Beginn 6. Lebensjahr	Auffrisch-Impfung Diphtherie-Tetanus-Pertussis (TdaP) Kombinationsimpfung, reduzierter Gehalt an Diphtherie-Toxin	
ab Beginn 10. - 17. Lebensjahr	<p>Auffrisch-Impfung Polio (IPV)</p> <p>Tetanus-Diphtherie (Td) zur Auffrischung (im Rhythmus von 10 Jahren)</p> <p>Auffrisch-Impfung Pertussis (aP, vorzugsweise kombiniert mit Td als TdaP oder zusätzlich mit der Impfung gegen Polio als TdaP-Polio)</p> <p>Masern-Mumps-Röteln (MMR) für alle Kinder und Jugendliche, die bisher nicht geimpft wurden oder mit unvollständigem Impfschutz</p> <p>Hepatitis B für ungeimpfte Jugendliche</p> <p>Varizellen-Impfung für alle Jugendlichen, die bisher keine Windpocken durchgemacht haben</p>	<p>Speziell vor Geburt eines Kindes bzw. für Frauen mit Kinderwunsch sollte für diese und für enge Haushaltskontakte und Betreuer des Neugeborenen überprüft werden, ob ein adäquater Immunschutz (Impfung oder mikrobiologisch bestätigte Erkrankung innerhalb der vergangenen 10 Jahre) gegen Pertussis vorliegt. Dieser sollte ggf. mit einem Kombinationsimpfstoff (TdaP) unter Berücksichtigung der Indikation der anderen im Impfstoff enthaltenen Antigene aktualisiert werden.</p>

